



Authenticatie scenario's


Uitwisseling van de BgZ (en documenten) via het LSP

Scenario's voor de BgZ uitwisseling (verwijzen/overdragen)

Nr	Scenario
1.	Uitvoeren push met AORTA 8 tokens i.c.m. UZI-pas handelingen in zorgproces a) Door verantwoordelijk zorgverlener zelf b) Door gemandateerde
2.	Uitvoeren push met AORTA 8 tokens zonder UZI-pas handelingen in zorgproces
3.	Uitvoeren push met AORTA 8 tokens en ZORG-ID smart, nog niet beschikbaar i.c.m. FHIR
4.	Uitvoeren pull na notificatie met AORTA 8 tokens i.c.m. met UZI-pas handelingen in zorgproces a) Door verantwoordelijke zorgverlener zelf b) Door gemandateerde
5.	Uitvoeren pull na notificatie met AORTA 8 tokens (automatisch ophalen via systeem)

Legenda

Rollen



= **Patiënt**



= **Zorgverlener**



= **Ondersteuner**

Tokens



= **Transactietoken**



= **Mandaattoken**



= **Inschrijftoken**



= **Consenttoken**

UZI-middelen



= **zorgverlenerpas**



= **medewerkerpas**



= **servercertificaat**


Mandaattoken: bewijs dat de zorgverlener die het mandaattoken heeft aangemaakt, toestemming heeft gegeven aan bepaalde zorgverleners en/of systemen om onder zijn verantwoordelijkheid een LSP-bevraging te doen;

Inschrijftoken: bewijs dat de patiënt is ingeschreven bij de zorgaanbieder;


Consenttoken: bewijs dat er veronderstelde toestemming is van de patiënt om gegevens in het kader van een verwijzing/overdracht beschikbaar te stellen

Transactietoken: bewijs dat het bericht, het inschrijf- of consenttoken en het mandaattoken van de bewuste applicatie komt


1. a) Uitvoeren push met UZI-pas & lezer door bevoegd zorgverlener




1. b) Uitvoeren push met UZI-pas & lezer door gemandateerde




2. Uitvoeren push met AORTA 8 tokens (zonder UZI-pas handeling in zorgproces)




3. Uitvoeren push met AORTA 8 tokens & ZORG-ID Smart (zonder UZI-pas handelingen in zorgproces)



4. a) Uitvoeren pull na notificatie handmatig met UZI-pas door bevoegd zorgverlener



4. b) Uitvoeren pull na notificatie handmatig met UZI-pas door gemandateerde



5. Uitvoeren pull na notificatie met AORTA-tokens via systeem (automatisch ophalen)

